



Amministrazione Trasparente (/Amministrazione_Trasparente) | Profilo del committente (/Entra-in-Regione/Profile-del-committente) | Segnalazione di semplificazione (/Sportello-per-la-semplificazione) | Come fare per (<http://procedimenti.regione.marche.it/>) | Rubrica (/Rubrica) | URP (/Amministrazione-Trasparente/Contatti)



(<https://www.regione.marche.it/>)

	In Primo Piano (/)	Regione Utile (/Temi)	Entra in Regione (/Entra-in-Regione)
--	--------------------	-----------------------	--------------------------------------

News ed Eventi (<https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi>)

<https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi>  

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017 17:32

VACCINAZIONI PER LE DONNE IN ETÀ FERTILE E IN GRAVIDANZA (<https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/53269/VACCINAZIONI-PER-LE-DONNE-IN-ETÀ-FERTILE-E-IN-GRAVIDANZA>)

Come fare per,	55 views	Torna alle news (/)
----------------	----------	---------------------



(<https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/53269/VACCINAZIONI-PER-LE-DONNE-IN-ETÀ-FERTILE-E-IN-GRAVIDANZA>)

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare 7 agosto 2018 per la promozione della salute femminile in età fertile, in previsione e durante la gravidanza con l'obiettivo di proteggere la donna e il nascituro da alcune malattie attraverso specifici vaccini. Per un'informazione più completa sono riportate anche le vaccinazioni che non possono essere fatte in gravidanza.

Fonte: *Ministero della Salute*

VACCINAZIONI IN ETÀ FERTILE

Alcune malattie possono incidere negativamente sulla fertilità o avere conseguenze sull'esito di una gravidanza. Di conseguenza, per le donne in età fertile sono indicate, se non già immuni, le vaccinazioni contro morbillo (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=13&area=Malattie_infettive), parotite (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=16&area=Malattie_infettive), rosolia (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=11&area=Malattie_infettive), varicella (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=15&area=Malattie_infettive) e papilloma virus (HPV) (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=14&area=Malattie_sessualmente_trasmissibili). Di grande importanza è anche il richiamo decennale della vaccinazione contro difterite (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=2&area=Malattie_infettive), tetano (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=6&area=Malattie_infettive) e pertosse (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=7&area=Malattie_infettive).

VACCINAZIONI IN PREVISIONE DI UNA GRAVIDANZA

In previsione di una gravidanza, è necessario che le donne siano protette nei confronti di morbillo-parotite-rosolia (MPR) e della varicella, dato l'elevato rischio, per il nascituro, derivanti dall'infezioni materna durante la gravidanza, specie se si verifica nelle prime settimane di gestazione.

^

Per la varicella contratta nell'immediato periodo pre-parto, il rischio, oltre che per il nascituro, può essere molto grave anche per la madre. Poiché sia il vaccino MPR che quello della varicella sono controindicati in gravidanza, è necessario che, al momento dell'inizio della gravidanza, la donna sia già vaccinata regolarmente (con due dosi) da almeno un mese.

VACCINAZIONI IN GRAVIDANZA

Nel corso della gravidanza sono raccomandate le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse (dTpa) e influenza (se la gestazione si verifica nel corso di una stagione influenzale), che devono essere ripetute ad ogni gravidanza.

Di grande rilievo è la vaccinazione dTpa da effettuare ad ogni gravidanza, anche se la donna sia già stata vaccinata o sia in regola con i richiami decennali o abbia avuto la pertosse. Infatti, la pertosse contratta dal neonato nei primi mesi di vita può essere molto grave o persino mortale e la fonte di infezione è frequentemente la madre. Il periodo raccomandato per effettuare la vaccinazione è il terzo trimestre di gravidanza, idealmente intorno alla 28a settimana, al fine di consentire alla gestante la produzione di anticorpi sufficienti e il conseguente passaggio transplacentare. Il vaccino dTpa si è dimostrato sicuro sia per la donna in gravidanza sia per il feto.

La vaccinazione anti-influenzale (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=32&area=Vaccinazioni) è raccomandata e offerta gratuitamente alle donne che all'inizio della stagione epidemica dell'influenza si trovino nel secondo o terzo trimestre di gravidanza.

I VACCINI CONTROINDICATI IN GRAVIDANZA

I vaccini contro MPR e varicella, contenendo vaccini a virus vivi attenuati, non possono essere somministrati in gravidanza, sebbene l'effettuazione accidentale della vaccinazione in donne che non sapevano di essere in gravidanza non ha mai fatto registrare un aumento di aborti o malformazioni. È, inoltre, opportuno che le donne che intendono programmare una gravidanza siano informate della necessità di posticiparla di un mese dopo la vaccinazione. Si sottolinea che l'esposizione accidentale della donna in gravidanza alla vaccinazione o l'inizio di una gravidanza entro le quattro settimane successive alla vaccinazione non rappresentano indicazioni all'interruzione volontaria di gravidanza. Nel caso una donna non risulti immune, è importante che sia vaccinata prima della dimissione dal reparto di maternità o, comunque, le sia fissato un appuntamento presso il servizio vaccinale nel periodo immediatamente successivo al parto.

Anche la vaccinazione anti-HPV (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=31&area=Vaccinazioni) non è attualmente consigliata durante la gravidanza, poiché non sono stati effettuati studi specifici sull'impiego del vaccino in donne gravide. L'eventuale somministrazione accidentale in gravidanza non comporta comunque l'indicazione all'interruzione volontaria della stessa, mentre la vaccinazione dovrà essere sospesa e le successive dosi rimandate sino al completamento della gravidanza.

Fonte: Ministero della Salute

Regione Marche Giunta Regionale (CF 80008630420 P.IVA 00481070423) via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona - tel. 071.8061
casella p.e.c. istituzionale : regione.marche.protocollogiunta@emarche.it (<mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it>)
Sito realizzato su CMS DotNetNuke by DotNetNuke Corporation
Autorizzazione SIAE n° 1225/I/1298

Copyright 2021 by Regione Marche

[Privacy \(https://www.regione.marche.it/Privacy\)](https://www.regione.marche.it/Privacy) | [Termini Di Utilizzo \(https://www.regione.marche.it/Terms\)](https://www.regione.marche.it/Terms) | [Informativa sui Cookie](#)
(<http://cohesion.regione.marche.it/cohesioninformativo/Informativa-Cookie>) | [Accessibilità \(/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Accessibilità\)](#) | [Dichiarazione di Accessibilità](#)
(<https://form.agid.gov.it/view/5858b49c-5914-4aa1-89c6-38115ee1bfb8>) | [Sitemap \(/Mappa-del-sito\)](#) | [Login \(?ctl=login\)](#)